



Hoko[®] Ex[®]

EFEKTYWNE ZWALCZANIE MUCH


Muchy należą do najbardziej uciążliwych nieproszonych gości w chlewniach. Ich obecność potrafi skutecznie uprzykrzyć życie zarówno pracownikom obiektu, jak i samym zwierzętom.

Problem much w chlewniach nasila się szczególnie latem. Zwalczanie much jest jednym z elementów bioasekuracji, czyli niedopuszczania do wprowadzania drobnoustrojów chorobotwórczych. Groźne zarazki mogą być bowiem przenoszone przez owady na znaczne odległości.

Muchy atakując zwierzęta wywołują u nich niepokój, a to przekłada się na gorsze wyniki produkcyjne. Świnie pobierają mniej paszy, gorzej przyrastają. Aby uwolnić się od przebywających na skórze owadów ocierają się o ściany kojca i inne przedmioty. Drażniące działanie much i otarcia mogą powodować stany zapalne skóry. U loch karmiących niepokój związany z obecnością much może wpływać na obniżenie mleczności i zaburzenia w karmieniu pigląt.



Optymalną likwidację much można osiągnąć dzięki **likwidacji stadium larwy, które jest istotne dla cyklu życiowego much.**



OGÓLNE ZALECENIA

Hoko®Ex® jest preparatem larwobójczym do stosowania na obornik, ściółkę oraz gnojowicę. Hamuje rozwój larw zanim się przekształcą w dorosłe osobniki. Znakomity efekt uzyskuje się przy jednoczesnym zastosowaniu preparatów na dorosłe osobniki. Działa przez okres 6-ciu tygodni.

Preparat Hoko®Ex® jest łatwy w zastosowaniu, produkt można stosować w formie suchej jak również w formie do polewania i opryskiwania powierzchni.

Przed użyciem Hoko®Ex® należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much, a następnie użyć produktu na całej powierzchni występującego problemu.



SPOSÓB UŻYCIA

KIERUNEK ZWALCZANIA: **LARWY MUCH**

DOZOWANIE

250 g produktu Hoko®Ex® na 10 m²

250 g produktu Hoko®Ex® rozpuścić w 1 do 4 l wody – użyć opryskiwacza plecakowego 250 g produktu Hoko®Ex® rozpuścić w 10 l wody – polewanie przy pomocy konewki

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie na sucho:

Preparat należy równomiernie rozprowadzić „rozsypanie” na całej powierzchni podłogi w budynku inwentarskim

Polewanie lub oprysk powierzchni:

W oborach dla krów, cieląt oraz stajniach należy użyć Hoko®Ex® wzdłuż ścian na pasie ok 50 cm w miejscach nagromadzenia ściółki. W chlewniach z rusztami należy produkt użyć na całej powierzchni. W przypadku podłóg częściowo pokrytych rusztami również należy użyć Hoko®Ex® na całej powierzchni.

SKŁAD: cyromazyna SG2%, nr CAS 662128, nosnik obojętny 98%. **NR REJESTRACJI:** 2085/05 z 01.02.2005 r.

