Prophyl® 2000

Trzy kierunki dezynfekcji



Do użytku profesjonalnego
Produkt biobójczy PT3 -
Higiena weterynaryjna

Szerokie spektrum działania
Efekt bakterio, wiruso i grzybobójczy

HUVEPHARMA®
We add performance to your business

PROPHYL® 2000 • 3 kierunki dezynfekcji

Główne zastosowanie
Produkt przeznaczony do stosowania w celu dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z utrzymaniem oraz transportem zwierząt.

Właściwości fizyko-chemiczne
Całkowicie rozpuszczalna w wodzie niebieska ciecz.
- Zapach sosny / Gęstość = 1,02
- PH czystego produktu: 2,2
- Kompatybilność: brak znanych interakcji w zastosowaniu razem ze środkami owadobójczymi.

Toksyczność - Ekotoksyczność
Żrący - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne - łatwopalny

Toksyczność
- Po spożyciu dla myszy: 0,549ml/kg
- Po spożyciu dla szczura: 1,691 ml/kg

Biodegradowalność
- Chlorokrezol: OECD 301 C metoda > 90%
- Glutaral: OECD301A metoda =85%
- Chlorki benzylo- alkilodimetyloamonium: OECD 303A metoda > 90%

Skład
Unikalna kombinacja trzech substancji aktywnych z uzupełniającym się spektrum działania:

- Chlorki czwartorzędowych związków amoniowych – chlorki benzylo- alkilodimetyloamonium : 9.70%(m/m)
- Glutaral: 12.60%(m/m)
- Chlorokrezol:: 4.85% (m/m)

Formulacja PROPHYL® 2000 pozwala na doskonałą stabilność w twardej wodzie dodatkowo preparat nie jest agresywny w stosunku do powierzchni na których jest stosowany.

Sposoby użycia
Opryskiwanie powierzchni i pojazdów
Dawka: 0.4% (1 :250) do 1.0 % (1:100)

Po uprzednim umyciu i spłukaniu powierzchni rozprowadzić roztwór PROPHYL® 2000 przy użyciu opryskiwacza niskociśnieniowego. Użyj 200 do 250 ml roztworu na metr kwadratowy. Pozostaw roztwór na minimum 30 minut. Nie spłukiwać.

Zamgławianie termiczne/ dezynfekcja powietrzna
Użyj 1,6 ml czystego PROPHYL® 2000 na 1 metr sześcienny. (tj. 4,5 l czystego produktu dla budynku o powierzchni 1000 m2). Można wymieszać w stosunku pół na pół z wodą do użycia w zamgławiaczu. (np. 4,5L PROPHYL® 2000 + 4,5L wody do budynku o powierzchni 1000 m2). Pozwól produktowi działać przez 4 godziny. Budynek musi być całkowicie pusty, bez obecności człowieka ani zwierząt. Okna i wentylatory muszą być zamknięte podczas zabiegu.

Maty dezynfekcyjne-dezynfekcja sprzętu
Dawka: 0.4% (1 :250) do 1.0 % (1 :100)
Rozcieńczyć PROHYL® 2000 w wodzie. Zanurz czysty sprzęt w roztworze na minimum 30 minut. Maty dezynfekcyjne - uzupełniaj środek raz w tygodniu lub częściej w przypadku dużego zabrudzenia.

Przechowywanie
PROPHYL® 2000 może być przechowywany przez 3 lata w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania
5, 20, 60 lub 200L HDPE beczka.

Skuteczność bakteriobójcza	Skuteczność grzybobójcza	Skuteczność wirusobójcza
Namaczanie: 0.40% EN 1656 – 10°C -30mn - Wysoki poziom zabrudzenia *Salmonella enteritidis, Proteus vulgaris 0.3%* *Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,* *Staphylococcus aureus: 0.4%* **Opryskiwanie: 1.0%** EN 14349– 10°C-30 mn - Wysoki poziom zabrudzenia *Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa,* *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus* **Zamgławianie/Zamgławianie termiczne: 1.6ml/m³** *Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa,* *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus*	**Drożdże** **Namaczanie: 0.50%** EN 1657 – 10°C -30mn - Wysoki poziom zabrudzenia *Candida albicans: 0.5%* **Opryskiwanie: 0.8%** EN 16438 – 10°C-30 mn - Wysoki poziom zabrudzenia *Candida albicans : 0.8%* **Grzyby:** Według normy NFT 72-300, 20°C, 15mn, twarda woda: *Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporioides 0.5%, Aspergillus fumigatus, Absidia corymbifera 0.8%*	**Według normy EN 14675: 1.0%** EN 14675 – 10°C, 30mn, Niski poziom zabrudzenia *Bovine Enterovirus (ECBO): 1.0%* *Świńska grypa: 1.0%* *Ptasia grypa H5N1: 0.5%* **Zgodne z normami weterynaryjnymi:** *Pryszczyca: 1.0%* *Choroba Newcastle: 0.40%* *Myksomatoza: 0.20%*

UWAGA

- **Używaj produktów biobójczych ostrożnie.**
- **Przed użyciem przeczytaj etykietę.**
- **Nie stosować na powierzchnie mające kontakt z paszą lub żywnością.**
- **Podczas stosowania noś rękawice, okulary ochronne i maskę.**
- **Nie jedz i nie pij.**
- **Po użyciu umyj ręce i twarz.**
- **Unikać kontaktu z produktami utleniającymi.**
- **Aby uzyskać więcej informacji, zobacz etykietę lub kartę charakterystyki.**



HUVEPHARMA®
We add performance to your business

HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O. • ALEJE JEROZOLIMSKIE 146D 02-305 • WARSZAWA • **POLSKA** • TEL.: +48 22 336 77 23 • MOBILE: + 48 607 950 138 • BIURO@HUVEPHARMA.COM

Prophyl_2000.Br(2p).PL01.0320/GI